

Untersuchung der kontaktinduzierten Keimbildung mithilfe der Mikrofluidik: Einfluss des pH-Werts bei Protein-stabilisierten Tropfen

Typ: Bachelor-/Masterarbeit
Beginn der Arbeit: ab sofort
Betreuerin: M.Sc. Gina Kaysan
Aufgabensteller: Prof. Dr.-Ing. Matthias Kind

Motivation und Zielsetzung:

Emulsionen mit einem kristallinen Dispersphasenanteil finden in Bereichen der chemischen, pharmazeutischen und „life science“-Industrie heutzutage große Anwendung. Da die Kristallisation die Produkteigenschaften und -qualität beeinflusst, liegen aktuelle Forschungsschwerpunkte auf der Untersuchung dieses Themengebiets.

Die Kristallisation von Emulsionen hängt neben der Unterkühlung und dem Keimbildungsmechanismus noch von weiteren Faktoren wie der Strömungsgeschwindigkeit ab. Vor allem die Phasenumwandlung der Emulsionstropfen in Feststoffpartikeln durch Abkühlen der Emulsion ist entscheidend für die Produkteigenschaften. Um den Prozess der kollisionsinduzierten Keimbildung genauer zu untersuchen, wurde ein Messaufbau entwickelt, der es erlaubt, diesen Kristallisationsprozess mithilfe eines Polarisationsmikroskops genauer zu beobachten.




Abbildung 1: v.l.n.r.: Schmelzemulsion mit unterkühlten und kristallisierten Tropfen; beispielhafte Wärmebildaufnahme eines Mikrofluidikchips zur Untersuchung der Kontaktkristallisation; Versuchsaufbau.

Ziel der Arbeit soll sein, Erkenntnisse über den Kristallisationsprozess der kontaktinduzierten Kristallisation zu gewinnen und die Beeinflussungsmöglichkeiten durch die Wahl des pH Werts bei Protein-stabilisierten Tropfen aufzuzeigen.

Die Aufgabenstellung kann gerne an die eigenen Interessen angepasst werden. Meldet euch gern bei:

M.Sc. Gina Kaysan
gina.kaysan@kit.edu
Tel.: 0721 / 608-42619